



**DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL**



CUIDADOS POST-OPERATORIOS

- 1.- Cuidar con cautela a la mascota los primeros 3 a 5 días después de la cirugía. No debe dejarlo salir a la calle, no permita que haga ejercicio exagerado, déjelo en un lugar limpio, seco y con una temperatura templada.
- 2.- Administrar los medicamentos como se indica en la receta médica.
- 3.- Cuidar que la mascota no lama o rasque la herida. En caso de no poder controlar esta situación, comprar o hacer un collar isabelino, colocar una venda o pedir asesoramiento.
- 4.- En caso de ser necesario, lavar la herida y aplicar una solución antiséptica y cicatrizante (topazone, aluspray, sulfadiazina de plata).
- 5.- La herida cicatrizará en un lapso de 8 a 14 días. No es necesario retirar los puntos ya que se caerán o serán reabsorbidos en un tiempo aproximado de 40 a 60 días. Si usted lo desea, puede ir con un médico veterinario para que retire la sutura después de los 14 días.
- 6.- Es común que las primeras 24 horas después de la cirugía, no tenga ganas de comer e incluso llegue a vomitar.
- 7.- Si tiene alguna duda o percibe algún otro problema con su mascota, favor de llamar al médico veterinario responsable de la cirugía o visite a su médico de confianza.



**DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL**



CUIDADOS POST-OPERATORIOS

- 1.- Cuidar con cautela a la mascota los primeros 3 a 5 días después de la cirugía. No debe dejarlo salir a la calle, no permita que haga ejercicio exagerado, déjelo en un lugar limpio, seco y con una temperatura templada.
- 2.- Administrar los medicamentos como se indica en la receta médica.
- 3.- Cuidar que la mascota no lama o rasque la herida. En caso de no poder controlar esta situación, comprar o hacer un collar isabelino, colocar una venda o pedir asesoramiento.
- 4.- En caso de ser necesario, lavar la herida y aplicar una solución antiséptica y cicatrizante (topazone, aluspray, sulfadiazina de plata).
- 5.- La herida cicatrizará en un lapso de 8 a 14 días. No es necesario retirar los puntos ya que se caerán o serán reabsorbidos en un tiempo aproximado de 40 a 60 días. Si usted lo desea, puede ir con un médico veterinario para que retire la sutura después de los 14 días.
- 6.- Es común que las primeras 24 horas después de la cirugía, no tenga ganas de comer e incluso llegue a vomitar.
- 7.- Si tiene alguna duda o percibe algún otro problema con su mascota, favor de llamar al médico veterinario responsable de la cirugía o visite a su médico de confianza.